

頭頸部癌に対するCetuximab+CDDP+5-FU療法

(アービタックス+シスプラチン+5-FU)

)RPHW_)RPHW_)

2013年03月11日 作成

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号 ＜＜SYPID＞＞	氏名 ＜＜ORIBP_KANJI＞＞	年齢 ＜＜SYAGE＞＞	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ～ ()	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 ☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用 ☐ 有 ☐ 無	【調製指示(2回目以降)】 ☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		

Day1(/)

本管

ソルデム3A 1,000mL ※混注不可
ビカネイト 1,000mL 側管




持続点滴

Day 2(/) ~ Day 4(/)

本管

ソルデム3A 1,000mL ※混注不可
ビカネイト 1,000mL 側管




持続点滴

※ビカネイトはday3までday4はソルデム1000mL

Day 8(/) ・ Day15(/)

本管

生理食塩水 500mL 側管
(側管終了後、抜去可)



終了抜去

全量 mL

Cetuximab+CDDP+5-FU療法

標準投与量:

Cetuximab 250 mg/m² day1,8,15
(初回のみ400mg/m²)

CDDP 75 mg/m² day1
5-FU 1000 mg/m² day1-4,

3週毎