

急性骨髄性白血病に対する Azacitidine(皮下注)+Venetoclax療法

(アザシチジン+ベネクレクタ) RPHW DRPHW

2022年08月22日 改訂(第2版)

2021年04月19日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》	年齢 様《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	実施サイクル コース目	コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(2日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

内服薬

ベネクレクタ (維持量)

★1日量 mg

を連日 服用

※ 1コース目の導入量は右表を参照

★ ベネクレクタ 導入時 投与量

	1日目	2日目	3日目以降 (維持量)
<input type="checkbox"/> 通常用量	100mg	200mg	400mg
<input type="checkbox"/> 中程度CYP3A4阻害剤併用時	50mg	100mg	200mg
<input type="checkbox"/> 強いCYP3A4阻害剤併用時	10mg	20mg	50mg

※適宜減量

Day 1 (/) ~ Day 7 (/)

皮下注

アザシチジン mg

※ 注射部位反応に注意

※ 使用前には必ず振盪すること

治療開始30分前にグラニセトロンゼリー 1包 内服

※ アザシチジンは常温で30分以内に必ず投与終了する

Azacitidine(皮下)+Venetoclax療法

標準投与量:

Azacitidine	75 mg/m ²	day1-7
Venetoclax	100 mg/body	day1
	200 mg/body	day2
	400 mg/body	day3-

4週毎