

食道癌に対する FP+Nivolumab療法(5-FU+CDDP+Nivolumab)

(フルオロウラシル+シスプラチン+オプジーボ)

)RPHW_)RPHW_)

2023年09月13日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様<<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()	コース目	□調製可 □TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			【調製指示(2日目以降)】			
			□調製可 □TEL連絡後調製			

Day1(/)

本管

ソルデム3A 1,000mL
ビカネイト 1,000mL

※混注不可

(24hr維持)

側管1

一旦主管止め

全開で

生理食塩水 50mL

専用ルート

(30 min)

生理食塩水 100mL
オプジーボ 240 mg

※主管止めて単ルートで投与すること！

全開で

生理食塩水 50mL

本管再開

(24hr維持)

生理食塩水 250mL
フルオロウラシル mg

※オプジーボ後の生食
終了後に開始！！

側管2

(2hr)

ラクテック 500mL

全開で

生理食塩水 50mL

開始時

(30min)

パロノセトロン 0.75mg/50mL
アロカリス 1V
デキサート6.6mg 1A
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 12mg)

遮光

(2hr)

生理食塩水 300mL
シスプラチン mg

全量
mL

全開で

生理食塩水 50mL

(i.v.)

フロセミド 1A

Day2(/) ~ Day5(/)

day2・3 本管

ソルデム3A 1,000mL
ビカネイト 1,000mL

※混注不可

(24hr維持)

day4・5 本管

ソルデム3A 1,000mL
(24hr維持)

側管1

(24hr維持)

生理食塩水 250mL
フルオロウラシル mg

全開で

生理食塩水 50mL

※day5のみ

午前中に！ 側管2

(30min)

生理食塩水 100mL
デキサート6.6mg 1V
(リン酸エステル換算 8mg)

Day15(/)

生理食塩水 100mL 本管

全開で

生理食塩水 50mL 側管

一旦主管止め

専用ルート

(30 min)

生理食塩水 100mL
オプジーボ 240 mg

※主管止めて単ルートで投与すること！

本管再開

全開で

生理食塩水 50mL

終了抜去

FP+Nivolumab療法

標準投与量:

Nivolumab 240 mg/body day1.15
5-FU 800 mg/m² day1-5
CDDP 80 mg/m² day1
4週毎