

悪性リンパ腫(非ホジキン)に対する エプキンリ療法(10サイクル目以降)

(Epcoritamab)

ORPHW_ORPHW_

2023年11月27日 承認

2024年04月23日 改訂

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>		cm	kg
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()	コース目	コース予定	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]						

Day1(/)

★皮下注部位

皮下注

エプキンリ皮下注 48 mg

液量 0.8mL

腹部・大腿部

【Dr必須項目】

前回投与時のサイトカインストーム

- グレード1:ステロイド不要(レジメンセットから削除)
 グレード2-3:day1-4にステロイドを投与

Day1(/) ~ Day4(/)

【サイトカインストーム予防】

 内服治療の場合

デカドロン

★1日 15 mg

皮下注射当日はエプキンリ投与60分前

 点滴治療の場合(エプキンリ投与前に施行)

本管

側管

生理食塩水 100mL
デキサート6.6mg 2V
(リン酸エチル換算 16mg)

(60min)

注意!! (指示ではないため主治医に指示確認要)

°C以上の発熱が認められた場合医師に

mg / ml

のアクテムラ入力依頼。(セット入力より)

Epcoritamab療法(10サイクル目以降)

標準投与量:

Epcoritamab 48 mg/body day 1

4週毎