

非小細胞肺癌に対する【80kg以上】CBDCA+Pemetrexed+Amivantamab療法 2コース目

(カルボプラチン+ペトレキセド+ライブリバント) <<ORIP>>RPHW\

2025年01月20日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 <<SYPID>>	氏名 <<ORIBP_KANJI>>	年齢 様 <<SYAGE>>	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示】 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

Day1 (/)

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

《カルボプラチン投与前に服用》

カロナール錠(500) 2T ライブリバントの
過敏反応防止のため

生理食塩水 500mL 本管

(4hr) 全開で 生理食塩水 50mL 側管

(30min) パロノセトロン 0.75mg/50mL
ポラミン5mg 1A
デキサート6.6mg 1V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 12mg)

(10min) ペトレキセド mg 全量 ml

(1hr) 生理食塩水 250mL
カルボプラチン mg

全開で 生理食塩水 50mL

専用ルート (2hr) 生理食塩水 215mL
ライブリバント 1750 mg

全開で 生理食塩水 50mL 全量 250 ml

終了抜去

Day2 (/) ~ Day3 (/)

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後)服用

【ペトレキセドの投与終了(中止)時の注意事項】

- (1) パンピタン末は、最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。
- (2) シアノコバミン注は、投与期間中および投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

使用Cre値	GFR算出式
mg/dl	<input type="checkbox"/> Cockcroft-Gault
<input type="checkbox"/> 補正あり	<input type="checkbox"/> Jelliffe
<input type="checkbox"/> 補正なし	<input type="checkbox"/> 24hrCcr
	<input type="checkbox"/>

CBDCA+PEM+Amivantamab療法

標準投与量

CBDCA AUC=5 day1
PEM 500 mg/m² day1
Amivan 1750 mg/body day1
3週毎