

悪性リンパ腫(非ホジキン)に対する エプキンリ療法(1サイクル目)3ステップ漸増

(Epcoritamab)

ORPHW_ORPHW_

2025年03月17日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>		cm	kg
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
備考[標準投与量逸脱など]						

Day1(/) Day8(/)
Day15(/) Day22(/)

《エプキンリ投与60分前に服用》

カロナール錠(500) 2T
ポララミン錠(2) 1TDay1(/) ~ Day4(/)
Day8(/) ~ Day11(/)
Day15(/) ~ Day18(/)
Day22(/) ~ Day25(/)

Day1(/)

皮下注

エプキンリ皮下注 0.16 mg
液量 1mL

Day8(/)

皮下注

エプキンリ皮下注 0.8 mg
液量 1mL

Day15 (/)

皮下注


エプキンリ皮下注 3 mg
液量 0.6mL

Day22(/)

皮下注

エプキンリ皮下注 48 mg
液量 0.8mL

【サイトカインストーム予防】

 内服治療の場合デカドロン
★1日 15 mg
皮下注射当日はエプキンリ投与60分前 点滴治療の場合(エプキンリ投与前に施行)

注意!! (指示ではないため主治医に指示確認要)

°C以上の発熱が認められた場合医師に

mg /

ml

のアクテムラ入力依頼。(セット入力より)

Epcoritamab療法(1サイクル目)

標準投与量:

Epcoritamab 0.16 mg/body day 1
0.8 mg/body day 8
3 mg/body day 15
48 mg/body day 22
4週毎

★皮下注部位

腹部・大腿部