

非小細胞肺癌に対する【80kg以上】Amivantamab+Lazertinib療法1コース目

(ライブリバント+ラズクルーズ)

<<ORPI>>RPHW_1

2025年07月28日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign


病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYID>>	<<ORIP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>		cm	kg
疾患名	施行予定日		実施サイクル	【調製指示】		
	月 日	~()	コース目	コース予定	<input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	
備考[標準投与量逸脱など]						放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無

Day1(/)

《ライブリバント投与30分前に服用》

カロナール錠(500) 2T ライブリバントの過敏反応防止のため

生理食塩水 500mL 本管




Day2(/)

《ライブリバント投与30分前に服用》

カロナール錠(500) 2T ライブリバントの過敏反応防止のため

生理食塩水 500mL 本管 側管



終了抜去

※ライブリバント投与速度

day1 50mL/hr → 75mL/hr
 day2 35mL/hr → 50mL/hr

投与開始から2時間後、速度UP可
(infusion reactionない場合)

day8 65mL/hr
 day15 85mL/hr
 day22 125mL/hr

ライブリバントは調製後10時間以内に投与すること

Amivantamab+Lazertinib療法

標準投与量

Amivan	350 mg/body	day1
	1050 mg/body	day2
	1400 mg/body	day8,15,22
Lazertinib 80-240 mg/body 連日 4週毎		